# UNA FORMULACIÓN CUYA ACCIÓN ES ATRAER-Y-MATAR, PARA EL MANEJO DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA CERATITIS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GANCHOTML 20 SP 1.0 es una formulación cuya acción es atraer-y-matar para el manejo las moscas de las frutas Ceratitis y otras moscas que responden al producto. El atrayente alimentario basado en el paraferomona Trimedlure, atrayente para adultos machos de la mosca del Mediterráneo, hará que los machos ingieran el insecticida que conducirá a la muerte.

## INSECTOS OBJETIVO

Moscas de la fruta tefrítidas, especialmente la mosca del Mediterráneo y otros insectos que responden a GANCHO TML 20 SP 1.0.

## CULTIVO OBJETIVO

GANCHO TML 20 SP 1.0 está diseñado para su uso en el entorno agrícola para todos los cultivos de uva donde la mosca del Mediterráneo está presente. Su aplicación se da en cultivos donde se detectan los insectos objetivo y vegetación circundante que puede servir como sitios de descanso.

## INSTRUCCIONES DE USO

Aplique GANCHO TML 20 SP 1.0 en la primera detección de moscas de la fruta en las trampas de monitoreo. GANCHO TML 20 SP 1.0 se puede aplicar mediante pistolas de calafateo, válvulas dosificadoras o equipo similar. La dosis de 200g/ha GANCHO TML 20 SP 1.0 debe ser dispersada en el campo a intervalos regulares en puntos de aplicación de producto de 3 g. Ubique la aplicación de GANCHO TML 20 SP 1.0 en la corteza de las ramas, tronco u otras estructuras, y cuando se aplique directamente en el al cultivo, intente aplicarlo en el borde del dosel central, aplicándolo a ramas horizontales o semi-horizontales. **EVITE LA APLICACIÓN DIRECTA SOBRE LAS FRUTAS**. Evite la aplicación durante las horas más calurosas del día. Para obtener los mejores resultados, recoja y retire regularmente la fruta caída del área. La eliminación de la fruta del suelo reduce la competencia de fuentes alternativas de alimentos con GANCHO TML 20 SP 1.0 y mejora el rendimiento del producto. El rendimiento puede medirse evaluando el daño a los cultivos utilizando métodos conocidos. Vuelva a aplicar GANCHO TML 20 SP 1.0 basado en datos de monitoreo o al menos cada 8 a 10 semanas. Utilice intervalos más cortos en la maduración de la fruta. GANCHO TML 20 SP 1.0 tiene propiedades de resistencia a la intemperie y soporta eventos de lluvia. No aplicar sobre superficies mojadas. GANCHO TML 20 SP 1.0 no controlará las larvas. Consulte a su distribuidor o un representante de ISCA Technologies para obtener información adicional.

## DOSIS DE APLICACIÓN

Independientemente de las condiciones de campo y la densidad de mosca de la fruta por área, la dosis del GANCHO TML 20 SP 1.0 a utilizar es 200 g/ha.

## VENTAJAS

El uso de GANCHO TML 20 SP 1.0 conducirá a una disminución significativa de dano na fruta porque las moscas de la fruta son atraídas directamente por la fuente de su muerte. Esta forma de eliminar las moscas, de manera enfocada también es más efectiva para mantener las poblaciones bajo control, al mismo tiempo que permite gestión más eficaz del uso y exposición de insecticidas.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (dias) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Cientifico | Kg/200L | Kg/Ha | | |
| Vid | Mosca Med. de la fruta | *Ceratitis capitata* | – | 0.2 | 0 | 0.5 |
| Mandarina | Mosca Med. de la fruta | *Ceratitis capitata* | – | 0.2 | 1 | 0.3 |
| Arándano | Mosca Med. de la fruta | *Ceratitis capitata* | – | 0.2 | 0 | 1.5 |
| Mango | Mosca Med. de la fruta | *Ceratitis capitata* | – | 0.2 | 1 | 0.02 |
| Palto | Mosca Med. de la fruta | *Ceratitis capitata* | – | 0.2 | 1 | 0.03 |

**PC**: Periodo de carencia (días). **LMR** Limite máximo de resíduos.



APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN UNA PLANTACIÓN DE UVA



©CC SCOTT BAUER, USDA

*Ceratitis capitata*

### GANCHO TML 20 SP 1.0 - CÓDIGO FK063
### PQUA Nª 3425 - SENASA

**COMPOSICIÓN**

- Spinosad
- Trimedlure
- Emulsiones de aceite, cera y agua

**APARIENCIA**

Pasta de rosa a rojo.

**ALMACENAMIENTO**

Almacene el producto en contenedores sellados, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Para una vida útil óptima, no exceda los 25°C. No congelar.

**DURACIÓN**

24 meses a 25°C.

**PRECAUCIONES**

Producto está listo para usar. No diluir. Use guantes durante la aplicación.

**EMBALAJE**

Tubo de calafateo de 250 g, tubo de calafateo de 750 g, cubos, otros.

V02 - 11/02/2026

ISCA® AGTEN®

**ISCA Latam**
BR 285, km 461,1 nº 2951
Ijui-RS, 98700-000, Brasil
+55 (55) 3332-2326
**www.isca.com.br**